

CAMPOSATO®

Herbicida agrícola

Solución acuosa

Producto registrado: RSCO-HEDE-0230-X0229-013-41.00

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
SAL ISOPROPILAMINA DE GLIFOSATO: 2-(fosfonometilamino)acetato con un contenido de glifosato de 74% (Contiene 360 g/L de glifosato a 20 °C).	41.00
INGREDIENTES INERTES:	
Neutralizante, humectante, quelante, acondicionador y diluyente	59.00
TOTAL	100.00

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO.

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

CAMPOSATO® es un herbicida no selectivo sistémico de acción total. Actúa sobre cualquier parte verde de las plantas por lo que debe evitarse el contacto de la aspersión con el cultivo. Este producto se aplica al follaje de las malezas. El ingrediente activo es absorbido por las hojas y llega hasta las raíces, rizomas y meristemos apicales de las malezas ya emergidas. La actividad sistémica de este suelo y agua con materia orgánica en suspensión. No existe efecto del producto a través de la zona radicular de las malezas, por lo consiguiente aplicaciones realizadas antes de la siembra, o antes de la emergencia de los cultivos no tiene efecto alguno sobre dichos cultivos.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha.)	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) ²
Acelga	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i>) Lampotillo, gigantón, acahual (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar (<i>Sida rhombifolia</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	3.0-4.0	
	Acahuallilo, mozote* (<i>Bidens pilosa</i>) Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	3.0-5.0	

	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)*	4.0-8.0	
Agave	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>)*	1.0-3.0	
	Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>)	1.5-3.0	
	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estreillta, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Guinar (<i>Sida rhombifolia</i>) Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Amargosa (<i>Parthenium hysterophus</i>) Cola de zorra (<i>Setaria viridis</i>) Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	3.0-3.5 ¹	
Algodón Transgénico (9-12)			SIN LÍMITE
Aguacate	Cola de ardilla, llendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote, zacate horquetilla* (<i>Brachiaria plantaginea</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla, correhuela anual (<i>Ipomoea purpurea</i>) Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>) Quelite, bledo (<i>Amaranthus albus</i>) Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Zacate guinea (<i>Panicum maximum</i>) Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Guinar, maravilla* (<i>Sida rhombifolia</i>)	3.0-4.0	
	Hierba del pollo (<i>Commelina erecta</i>)	5.0	
	Coquillo, coyotillo* (<i>Cyperus rotundus</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana* (<i>Cynodon dactylon</i>) Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Ajo	Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Perita, perilla (<i>Lopezia racemosa</i>) Hierba del pastor (<i>Acalipha virginica</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	1.5-2.5	SIN LÍMITE
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	

	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar, maravilla* (<i>Sida rhombifolia</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>) Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	
Alcachofa	Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar, maravilla* (<i>Sida rhombifolia</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Alfalfa	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar, maravilla (<i>Sida rhombifolia</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	
Apio	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar, maravilla (<i>Sida rhombifolia</i>)	3.0-4.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)* Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Frambuesa Zarzamora	Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>)	2.0-3.0²	SIN LÍMITE
Arroz	Coquillo (<i>Cyperus esculentus</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar, maravilla (<i>Sida rhombifolia</i>) Zacate gramma, pasto bermuda estrella africana* (<i>Cynodon dactylon</i>) Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>)	3.0-4.0	SIN LÍMITES
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	

Avena	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar (<i>Sida rhombifolia</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Berenjena	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lampotillo, gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Zacate gramma, pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	
Betabel	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lampotillo, gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar, maravilla (<i>Sida rhombifolia</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Brocoli	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lampotillo, gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar, maravilla (<i>Sida rhombifolia</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	
Cacahuete	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LÍMITES
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Guinar, maravilla* (<i>Sida rhombifolia</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Cacao	Hierba del pollo (<i>Commelina erecta</i>) Oreja de elefante (<i>Anthurium</i> spp.) Zacate perfumado (<i>Oplismenus hirtellus</i>)	2.0-3.0³	SIN LIMITE

	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	1.0-2.0	
	Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)		
	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Cafeto	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	SIN LÍMITES
	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Calabaza	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Caña de azúcar	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	SIN LIMITE
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	5.0-6.0	
	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	

Cebada	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	SIN LIMITE
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	2.0-4.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)		
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thitonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Cebolla	Estrellita, rosilla chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Perita, perilla (<i>Lopezia racemosa</i>) Hierba del pastor (<i>Acalypha virginica</i>) Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	1.5-2.5	SIN LIMITE
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón acahual* (<i>Thitonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
Centeno	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thitonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	SIN LIMITE
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Ciruelo	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITES
	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thitonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	

Cítricos	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LÍMITES
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.)	1.5-3.0	
	Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)		
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	2.0-4.0	
	Hierba del pollo (<i>Commelina erecta</i>)	5.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
	Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Zacate guinea (<i>Panicum maximum</i>) Quelite, bledo (<i>Amaranthus albus</i>) Zacate hierba del conejo (<i>Digitaria filiformis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Rosilla (<i>Gallinsoga hispida</i>) Flor amarilla (<i>Melampodium divaricatus</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Golondrina, arlomo (<i>Boerhavia erecta</i>) Cola de zorra (<i>Setaria lutescens</i>) Zacate (<i>Paspalum virginata</i>) Zacate (<i>Hyparthenia rufa</i>) Coquillo, coyotillo* (<i>Cyperus rotundus</i>)	6.0	
Coliflor	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Chícharo	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Chile	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	2.0-4.0 3.0-4.0	SIN LIMITE
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	

Durazno	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina * (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana	4.0-6.0	
	(<i>Cynodon dactylon</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Espinaca	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Frijol	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina * (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite, bledo (<i>Amaranthus albus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Guayabo	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina * (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Verdolaga (<i>Potulaca oleracea</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite, bledo (<i>Amaranthus albus</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	

	Lampotillo, gigantón, acahual*(<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Jitomate	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)		
	Lampotillo, gigantón, acahual*(<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)		
Lechuga	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)		
	Lampotillo, gigantón, acahual*(<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)		
Limonero	Lampotillo, gigantón, acahual*(<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	SIN LIMITE
Maíz	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Cola de ardilla, liendrilla*(<i>Eragrostis mexicana</i>)		
	Luzaga, zacate pata de gallina *(<i>Digitaria sanguinalis</i>)		
	Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>)		
	Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)		
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>)		
	Quelite, bledo (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>)		
	Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>)		
	Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	1.5-3.0	
	Malva (<i>Malva</i> sp.)		
	Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)		
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	2.0-4.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)		
	Lampotillo, gigantón, acahual*(<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)		
Mango	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Cola de ardilla, liendrilla*(<i>Eragrostis mexicana</i>)		
	Luzaga, zacate pata de gallina *(<i>Digitaria sanguinalis</i>)		
	Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>)		
	Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)		
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>)		
	Quelite, bledo (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>)		
	Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>)	1.5-3.0	
	Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Malva (<i>Malva</i> sp.)		
	Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)		
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual*(<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	

	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Manzano	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Melon	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	2.0-4.0 3.0-4.0	SIN LIMITE
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Mostaza	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	2.0-4.0 3.0-4.0	SIN LIMITE
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rolo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Nectario	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	

Nogal	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Papa	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	4.0-8.0	
Papayo	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)		SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
Pastos	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Pepino	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Peral	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	

	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Platano	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina * (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>) Zacate guinea (<i>Panicum maximum</i>) Rosilla (<i>Gallinsoga hispida</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>) Zacate hierba del conejo (<i>Digitaria filiformis</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Golondrina, arlomo (<i>Boerhavia erecta</i>) Borreria, botón blanco* (<i>Borreria ocimoides</i>) Cola de zorra (<i>Setaria lutescens</i>) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana	4.0	
	(<i>Cynodon dactylon</i>) Zacate (<i>Paspalum virginata</i>) Arroz rojo (<i>Oryza sativa</i>) Mozote, zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Zacate (<i>Hyparthenia rufa</i>) Coquillo, coyotillo* (<i>Cyperus rotundus</i>)		
	Hierba del pollo (<i>Commelina erecta</i>)	5.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Rabano	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Sandia	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Tithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina * (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	

Sorgo	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	SIN LIMITE
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Soya	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>) Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)		
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
Trigo	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	

Vid	Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Cola de ardilla, liendrilla* (<i>Eragrostis mexicana</i>) Luzaga, zacate pata de gallina* (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pasto de conejo, zacate mota* (<i>Chloris virgata</i>) Zacate camalote (<i>Brachiaria plantaginea</i>)	1.0-2.0	SIN LIMITE
	Mala mujer (<i>Solanum nigrum</i>) Bledo común (<i>Amaranthus spinosum</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Bolsa del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Malva (<i>Malva</i> sp.) Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>)	1.5-3.0	
	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0-4.0	SIN LIMITE
Zanahoria	Lampotillo, gigantón, acahual* (<i>Thithonia tubaeiformis</i>)	3.0-4.0	
	Coquillo (<i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana (<i>Cynodon dactylon</i>)	4.0-6.0	
	Bledo rojo (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Correhuela, gloria de la mañana (<i>Convolvulus arvensis</i>)	4.0-8.0	

Observaciones.

¹Realizar una aplicación en post-emergencia cuando la maleza no supere los 15 cm de altura; volumen de aplicación 500-550 L de agua/ha.

²Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza; volumen de aplicación 230-330 L de agua /ha

³Realizar una aspersión en post-emergencia al cultivo y maleza: volumen de aplicación 300-400 L/ha

⁴**INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

aplicación. **TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 24 horas después de la

LMR(Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Acelga	0.1	Unión Europea
Agave	No aplica	
Aguacate	0.2	EPA*
Ajo	0.1	Unión Europea
Alcachofa	0.2	EPA
Alfalfa	0.5	EPA
Apio	0.1	Unión Europea
Arroz	0.1	EPA
Avena	20.0	Unión Europea
Berenjena	0.1	EPA
Betabel	10	EPA
Brócoli	0.2	EPA
Cacahuete	0.1	EPA
Cacao	0.2	EPA
Cafeto	1.0	EPA
Calabaza	0.5	EPA
Caña de azúcar	2.0	EPA
Cebada	30.0	EPA
Cebolla	0.1	Unión Europea
Centeno	10.0	Unión Europea
Chicharo	8.0	EPA
Chile	0.1	EPA
Ciruelo	0.1	Unión Europea
Cítricos	0.5	EPA
Coliflor	0.2	EPA
Durazno	0.1	Unión Europea
Espinaca	0.2	EPA
Frijol	5.0	EPA
Guayabo	0.2	EPA
Jitomate	0.1	EPA
Lechuga	0.2	EPA
Limonero	0.5	EPA
Maíz	5.0	EPA
Mango	0.2	EPA
Manzano	0.1	Unión Europea
Melón	0.5	EPA
Mostaza	10.0	Unión Europea
Nectarino	0.1	Unión Europea
Nogal	0.1	Unión Europea
Papa	0.1	EPA
Papaya	0.2	EPA
Pastos	No aplica	
Pepino	0.5	EPA
Peral	0.1	Unión Europea
Plátano	0.2	EPA
Rábano	0.1	Unión Europea

	Sandía	0.5	EPA
Sorgo	20.0	Unión Europea	
Soya	20.0	EPA	
Trigo	10.	Unión Europea	
Vid	0.5	Unión Europea	
Zanahoria	5.0	EPA	
Algodón transgénico	No aplica		
Frambuesa Zarzamora	0.1	Unión Europea	

* Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón, o sombrero, mascarilla contra polvos y gases, lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Aplíquese en forma de aspersión sobre la maleza emergida.

CAMPOSATO® se aplica directamente sobre la maleza y asegurando buen cubrimiento para lograr el efecto deseado. Se recomienda que el equipo de aplicación esté en buen estado. Para una mejor efectividad aplique cuando la maleza se encuentre en etapas de crecimiento vigoroso, y hasta antes de la etapa de floración y fructificación.

En caso de aguas con contenido de sales, éstas deberán ser neutralizadas y ajustar el pH a un rango de 5 a 6 para preparar la mezcla de aplicación con el herbicida.

En los cultivos de arándano, frambuesa, fresa, grosella, zarzamora, agave, algodón transgénico, aguacate, cacao, cafeto, ciruelo, cítricos, durazno, guayabo, limonero, mango, manzano, nectarino, nogal, papayo, peral, plátano, y vid **la aplicación del herbicida se hace en post-emergencia a la maleza y dirigida a ésta.**

En los cultivos de acelga, ajo, alcachofa, alfalfa, apio, arroz, avena, berenjena, betabel, brócoli, cacahuate, calabaza, caña de azúcar, cebada, cebolla, centeno, jitomate, lechuga, maíz, melón, mostaza, papa, pastos, pepino, rábano, sandía, sorgo, soya, trigo y zanahoria, **la aplicación del herbicida se hace en pre-siembra del cultivo y post-emergencia a la maleza.**

CONTRAINDICACIONES.

+ No aplique este producto sin el equipo de protección adecuado, no aplicar con vientos mayores de 10 km/hr para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles a este producto herbicida, no aplicar en presencia de lluvia o cuando exista posibilidad de ésta para evitar que el producto sea lavado y contamine mantos acuíferos. Aplique en las primeras horas del día o al atardecer cuando haya poco viento, y temperaturas frescas; evite aplicar con presencia de rocío sobre las malezas ya que la efectividad del producto puede bajar.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones descritas en ésta. La aplicación de este producto debe ser dirigida a las malezas para evitar efectos fitotóxicos al cultivo.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”